

2007年に全国72施設から分離された臨床分離株12,919株 の各種抗菌薬に対する感受性サーベイランス

山口恵三・大野 章・石井良和・舘田一博

東邦大学医学部微生物・感染症学講座

岩田守弘

東邦大学医療センター大森病院臨床検査部

レボフロキサシンサーベイランスグループ

神田 誠

市立旭川病院

川村千鶴子

青森県立中央病院

秋沢宏次 清水 力

北海道大学病院

田代博美・堀内弘子・方山揚誠

八戸市立市民病院

今 信一郎・中村克司・

松田啓子

市立室蘭総合病院

保嶋 実

弘前大学附属病院

三木 誠

仙台赤十字病院

富永眞琴

山形大学医学部附属病院

林 雅人・大久保俊治・豊嶋俊光

平鹿総合病院

中川卓夫

小白川至誠堂病院

賀来満夫

東北大学病院

杉田暁大・伊藤辰美・加藤 純

由利組合総合病院

関根今生・塩谷譲司

癌研究会有明病院

諏訪部 章・山端久美子

岩手医科大学附属病院

堀内 啓・田澤庸子

NTT東日本関東病院

米山彰子

虎の門病院

住友みどり

横浜市立大学附属病院

熊坂一成

日本大学医学部附属板橋病院
(現 上尾中央総合病院)

齋藤武文

独立行政法人 国立病院機構 茨城東病院

小池和彦

東京大学医学部附属病院

秋山隆寿

足利赤十字病院

近藤成美・三澤成毅

順天堂大学医学部附属順天堂医院

家入蒼生夫・山本芳尚・岡本友紀

獨協医科大学病院

村田 満・小林芳夫

慶應義塾大学医学部

谷口信行

自治医科大学附属病院

岡本英行

川口市立医療センター

尾崎由基男・内田 幹

山梨大学医学部附属病院

山崎堅一郎

さいたま赤十字病院

村上正巳

群馬大学医学部附属病院

岡田 基

越谷市立病院

犬塚和久

安城更生病院

春木宏介

獨協医科大学越谷病院

権田秀雄・山口育男

豊橋市民病院

菅野治重・相原雅典

高根病院

藤本佳則・入山純司・浅野裕子

大垣市民病院

前崎繁文・橋北義一

埼玉医科大学病院

源馬 均

袋井市立袋井市民病院

(現 げんまクリニック)

宮島栄治

横浜市立大学附属市民総合医療
センター

前川真人

浜松医科大学附属病院

吉村 平
三重県立志摩病院

中谷 中
三重大学医学部附属病院

馬場尚志
名古屋大学医学部附属病院

一山 智
京都大学医学部附属病院

藤田信一
金沢大学附属病院

岡部英俊・茂籠邦彦・重田雅代
滋賀医科大学医学部附属病院

吉田治義・山下政宣・飛田征男
福井大学医学部附属病院

田窪孝行・日下部 正
大阪医科大学附属病院

正木浩哉・平城 均・中矢秀雄
関西医科大学附属滝井病院

河原邦光
大阪府立呼吸器・アレルギー
医療センター

佐野麗子
奈良県立医科大学附属病院

松尾収二・河野 久
天理よろづ相談所病院

湯月洋介・池田紀男・井戸向昌哉
日本赤十字社和歌山医療センター

相馬正幸・山本 剛
財団法人神戸市地域医療振興財団
西神戸医療センター

木下承皓・河野誠司
神戸大学医学部附属病院

岡 三喜男
川崎医科大学附属病院

草野展周
岡山大学病院

桑原正雄
県立広島病院

岡崎俊朗・藤原弘光・太田博美
鳥取大学医学部附属病院

長井 篤
島根大学医学部附属病院

藤田 準・根ヶ山 清
香川大学医学部附属病院

杉浦哲朗・上岡樹生
高知大学医学部病態情報診断学講座

村瀬光春
愛媛大学医学部附属病院

山根誠久・仲宗根 勇
琉球大学医学部附属病院

岡山昭彦

宮崎大学医学部附属病院

柳原克紀・松田淳一・河野 茂

長崎大学医学部・歯学部附属病院

青木洋介・草場耕二・中島由佳里

佐賀大学医学部附属病院

康 東天

九州大学病院

宮之原弘晃

鹿児島大学医学部・歯学部附属病院

小野順子

福岡大学病院

平松和史・犀川哲典

大分大学医学部附属病院

真柴晃一

北九州市立医療センター

(2009年5月26日受付)

我々は、1992年以降経年的に抗菌薬感受性サーベイランスを実施し本誌に報告してきた。今回は2007年に日本国内72施設から分離された臨床分離株19菌種12,919株の抗菌薬感受性サーベイランスの結果を従来の結果と比較し解析した。

呼吸器感染症の主要原因菌種である *Streptococcus pyogenes*, *Streptococcus pneumoniae*, *Moraxella catarrhalis*, *Haemophilus influenzae* はフルオロキノロン系抗菌薬 (FQs) に対し高い感受性を維持していた。一方, *S. pyogenes* のマクロライド系抗菌薬に対する経年的な耐性化の進行がより明確になった。*Escherichia coli* 以外の腸内細菌科の各菌種はFQsに対し高い感性率を示した。*E. coli* においてはおよそ30%近くの菌株がFQs耐性を示し, 耐性化がより進行している状況が示された。メチシリン耐性 *Staphylococcus aureus* (MRSA) 株のFQs耐性率はSitaflaxacin (STFX) に対する45%を除き, おおよそ95%と高率であった。それに対しメチシリン感性 *S. aureus* (MSSA) 株のFQs耐性率は約10%と低値であった。メチシリン耐性コアグラゼ陰性 *Staphylococci* (MRCNS) におけるFQs耐性率は, メチシリン感性コアグラゼ陰性 *Staphylococci* (MSCNS) よりも高かったが, MRSAに比べ低値であった。ただしMSCNSのFQs耐性率はMSSAの耐性率よりも高値であった。*Enterococcus faecalis* のFQs耐性率は22.5%~29.6%であったが, *Enterococcus faecium* のFQs耐性率は, STFX (58.3%) を除いて85%以上であった。尿路感染症由来 *Pseudomonas aeruginosa* 株におけるFQs耐性率は21~27%であり, 呼吸器由来株の13~21%に比べ高く過去のサーベイランスと同様の傾向を持続していた。一方多剤耐性緑膿菌株は, 尿路由来で5.6%, 呼吸器由来で1.8%であった。*Acinetobacter* spp. はFQsに対し高い感性率を示した。現在問題になっているカルバペネム耐性株が2.7%認められた。*Neisseria gonorrhoeae* のFQsに対する耐性率は86~88%と高い値が示された。

以上, 今回の感受性調査の成績から, 臨床での使用が15年以上経過したFQsに対し, メチシリン耐性 *Staphylococci*, *Enterococci*, *E. coli*, *P. aeruginosa*, *N. gonorrhoeae* は耐性化傾向が示されたが, それ以外の菌種では, 90%以上の高い感性率が保持されていた。

現在さまざまなタイプの抗菌薬耐性菌およびそれらの多剤耐性化が世界的な問題となっている。対策としては、抗菌薬の適正使用、新規抗菌薬開発、抗菌薬以外の抗感染症薬開発などが重要とされるが、一方で臨床分離株に対する広範囲な抗菌薬感受性動向調査による監視も重要となる。

フルオロキノロン系抗菌薬 (FQs) は、 β -ラクタム系抗菌薬とならび臨床で汎用される抗菌薬である。特に従来グラム陰性菌に偏って強い抗菌活性を示した FQs から、キノロンの作用標的である DNA ジャイレースとトポイソメラーゼ IV を平均的に阻害することで、グラム陽性菌にまで抗菌力を拡大したレボフロキサシン (LVFX) は^{1,2)}、FQs の中でも最も多く使用されている。

レボフロキサシンサーベイランスグループは、FQs の有用性を維持することが重要と考え 1992 年以来全国多施設の参加を得て、LVFX と他 FQs およびキノロン以外の各種抗菌薬に対する多菌種にわたる新鮮臨床分離株多数を用いた感受性動向調査を経年的に実施してきた^{3,4)}。その結果、呼吸器感染症原因菌種や腸内細菌科菌種に対しては一部の菌種を除き高い FQs 感受性が持続されているのに対し、*Escherichia coli* では 2000 年以降 FQs 耐性化の進行が著しく、またそれらの FQs 耐性株の中に第三世代セフェム耐性を示す基質特異性拡張型 β -ラクタマーゼ (ESBL) 産生株が有意に高く含まれることなどを明らかにしてきた。

また一方で MRSA、ペニシリン耐性 *Streptococcus pneumoniae* (PRSP)、ESBL 産生 *E. coli* あるいは *Klebsiella pneumoniae*、メタロ β -ラクタマーゼ (MBL) 産生グラム陰性桿菌の出現も経年的に増加する傾向も示してきた。さらには複数の抗菌薬耐性遺伝子を組み込み両端に挿入配列を持つ転移性 DNA が組み入れられた多剤耐性株が次々と出現し問題となっているが⁵⁾、それゆえにこれまで FQs に対し高い感受性を維持してきた菌種においても耐性株が出現増加する危険性は否定できな

い。従って経年的な FQs に対する抗菌薬感受性サーベイランスの実施の重要性が増しているものと思える。

今回 2007 年 1 月～12 月に日本国内 72 施設から分離された 19 菌種、12,919 株の臨床分離株に対する抗菌薬感受性サーベイランスを過去 7 回のサーベイランスに続いて実施したので、その結果を報告する。

材料および方法

1. 使用菌株

対象に用いた 19 菌種、12,919 株の菌株のリストを Table 1 に示した。また参加施設の一覧を Table 2 に示した。これらの菌株は 2007 年 1 月から 12 月に分離されたものである。各施設で分離された菌株は、株式会社ビー・エム・エル (BML, 埼玉) に搬送し、再同定後、抗菌活性を測定した。また同一患者からの重複株はすべて省いた。試験実施日までは各菌株はマイクロバンク (アスカ社) で -80°C にて保存した。

2. 使用抗菌薬

Levofloxacin (LVFX), Ciprofloxacin (CPFX), Tosufloxacin (TFLX), Sitafoxacin (STFX), Benzylpenicillin (PCG), Ampicillin (ABPC), Clavulanic acid・Amoxicillin (CVA/AMPC), Piperacillin (PIPC), Oxacillin (MPIPC), Cefaclor (CCL), Cefotiam (CTM), Cefdinir (CFDN), Cefpodoxime (CPDX), Ceftazidime (CAZ), Cefotaxime (CTX), Ceftriaxone (CTRX), Cefpirome (CPR), Meropenem (MEPM), Panipenem (PAPM), Imipenem (IPM), Aztreonam (AZT), Minocycline (MINO), Clarithromycin (CAM), Azithromycin (AZM), Telithromycin (TEL), Vancomycin (VCM), Sulfamethoxazole・Trimethoprim (ST), Gentamicin (GM), Amikacin (AMK),

Table 1. The number of isolates and their source.

Species	Respiratory tract	Urinary tract	Digestive tract	Blood	Puncture fluid	Secretion pus	Others	Number of strains
<i>Streptococcus pyogenes</i>	208	11	3	18	1	197	71	509
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	480	0	0	25	5	38	129	677
Methicillin-susceptible <i>Staphylococcus aureus</i> (MSSA)	205	37	12	91	22	253	116	736
Methicillin-resistant <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA)	345	43	31	89	18	136	82	744
Methicillin-susceptible Coagulase negative Staphylococci (MSCNS)	17	64	5	233	17	117	84	536
Methicillin-resistant Coagulase negative Staphylococci (MRCNS)	82	60	9	376	20	110	67	724
<i>Enterococcus faecalis</i>	73	295	41	97	24	110	43	683
<i>Enterococcus faecium</i>	35	214	76	91	29	68	39	552
<i>Moraxella catarrhalis</i>	362	1	0	1	0	16	154	534
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	0	80	0	0	0	27	3	110
<i>Escherichia coli</i>	59	382	47	111	18	96	30	743
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	259	161	49	83	16	67	28	663
<i>Citrobacter</i> spp.	91	235	80	27	18	78	44	573
<i>Enterobacter</i> spp.	249	128	46	92	18	64	84	681
<i>Serratia marcescens</i>	289	122	20	44	10	97	72	654
<i>Proteus mirabilis</i>	99	249	31	31	8	96	33	547
Indole-positive <i>Proteus</i> group	42	228	55	29	10	86	58	508
<i>Salmonella</i> spp.	0	3	190	12	1	3	1	210
<i>Haemophilus influenzae</i>	529	1	0	5	6	38	96	675
<i>Acinetobacter</i> spp.	333	45	12	79	1	74	54	598
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> from UTI	0	589	0	0	0	0	0	589
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> from RTI	673	0	0	0	0	0	0	673
	4430	2948	707	1534	242	1771	1288	12919

Table 2. List of the levofloxacin surveillance group.

北海道大学病院	安城更生病院
市立室蘭総合病院	豊橋市民病院
市立旭川病院	袋井市立袋井市民病院
東北大学病院	浜松医科大学附属病院
仙台赤十字病院	三重大学医学部附属病院
青森県立中央病院	三重県立志摩病院
弘前大学医学部附属病院	大垣市民病院
八戸市立市民病院	金沢大学附属病院
岩手医科大学附属病院	福井大学医学部附属病院
由利組合総合病院	京都大学医学部附属病院
平鹿総合病院	滋賀医科大学医学部附属病院
山形大学医学部附属病院	関西医科大学附属滝井病院
小白川至誠堂病院	大阪医科大学附属病院
東邦大学医学部	大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター
東京大学医学部附属病院	天理よろづ相談所病院
慶応義塾大学医学部	奈良県立医科大学附属病院
虎の門病院	日本赤十字社和歌山医療センター
順天堂大学医学部附属順天堂医院	財団法人神戸市地域医療振興財団 西神戸医療センター
癌研究会明病院	神戸大学医学部附属病院
日本大学医学部附属板橋病院	県立広島病院
NTT東日本関東病院	川崎医科大学附属病院
高根病院	岡山大学病院
さいたま赤十字病院	鳥取大学医学部附属病院
川口市立医療センター	島根大学医学部附属病院
獨協医科大学越谷病院	香川大学医学部附属病院
越谷市立病院	愛媛大学医学部附属病院
埼玉医科大学病院	高知大学医学部病態情報診断学講座
横浜市立大学附属病院	九州大学病院
横浜市立大学附属市民総合医療センター	福岡大学病院
独立行政法人 国立病院機構 茨城東病院	北九州市立医療センター
自治医科大学附属病院	長崎大学病院
独協医科大学病院	佐賀大学医学部附属病院
足利赤十字病院	大分大学医学部附属病院
群馬大学医学部附属病院	鹿児島大学医学部・歯学部附属病院
山梨大学医学部附属病院	宮崎大学医学部附属病院
名古屋大学医学部附属病院	琉球大学医学部附属病院

Chloramphenicol (CP) を用いた。

3. 抗菌活性測定

日本化学療法学会標準法である微量液体希釈法に従い、所定の抗菌薬を含有したフローズンプレート（栄研化学社製）を用いて最小発育阻止濃度 (MIC) を測定した。*Neisseria gonorrhoeae* については寒天平板希釈法により MIC を測定した。対

象菌種により、測定対象とする抗菌薬の種類、測定濃度範囲は異なる (Table 3)。

各菌種の抗菌薬感受性率は、Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, 2008)⁶⁾ の定める MIC ブレイクポイントに準じて算出したが、*S. pneumoniae* については CLSI (2007) の基準を用い、ペニシリン感性 *S. pneumoniae* (PSSP) (PCG の MIC ≤ 0.06 μg/mL)、PRSP (PCG の MIC ≥ 2

Table 4. *In vitro* activities of drugs against clinical isolates and percentages of isolates susceptible to test drugs on the basis of CLSI.

Species (Number of strains)	Antimicrobial agents	MIC (μ g/mL)			Susceptibility (%)		
		MIC range	MIC ₅₀	MIC ₉₀	Susceptible	Intermediate	Resistant
<i>Streptococcus pyogenes</i> (509)	LVFX	0.12~16	0.5	1.0	98.4	0.4	1.2
	CPFX	0.06~32	0.5	2.0	86.8	11.6	1.6
	TFLX	0.015~8.0	0.06	0.5	98.8	0.0	1.2
	STFX	0.008~0.5	0.03	0.06	100.0	0.0	0.0
	PCG	$\leq$ 0.03~0.06	$\leq$ 0.03	$\leq$ 0.03	100.0	0.0	0.0
	ABPC	$\leq$ 0.03~0.25	$\leq$ 0.03	$\leq$ 0.03	100.0	0.0	0.0
	CVA/AMPC	$\leq$ 0.03~0.25	$\leq$ 0.03	$\leq$ 0.03	100.0	0.0	0.0
	CCL	$\leq$ 0.03~2.0	0.12	0.12	100.0	0.0	0.0
	CTM	$\leq$ 0.03~2.0	0.06	0.06	99.8	0.2	0.0
	CFDN	$\leq$ 0.03~1.0	$\leq$ 0.03	$\leq$ 0.03	100.0	0.0	0.0
	CPDX	$\leq$ 0.03~0.5	$\leq$ 0.03	$\leq$ 0.03	100.0	0.0	0.0
	CTRX	$\leq$ 0.03~0.25	$\leq$ 0.03	$\leq$ 0.03	100.0	0.0	0.0
	PAPM	$\leq$ 0.008~0.015	$\leq$ 0.008	$\leq$ 0.008	—	—	—
	IPM	$\leq$ 0.008~0.03	$\leq$ 0.008	$\leq$ 0.008	—	—	—
	MINO	$\leq$ 0.03~8.0	0.06	2.0	90.4	5.7	3.9
	CAM	$\leq$ 0.03~>64	$\leq$ 0.03	8.0	76.8	1.0	22.2
	AZM	$\leq$ 0.03~>16	0.12	>16	74.5	0.2	25.3
<i>Streptococcus pneumoniae</i> (677)	TEL	$\leq$ 0.008~8	0.015	0.5	—	—	—
	VCM	0.25~1.0	0.25	0.5	100.0	0.0	0.0
	LVFX	0.25~16	1.0	1.0	98.8	0.2	1.0
	CPFX	0.06~32	1.0	2.0	87.0	9.2	3.8
	TFLX	0.03~8.0	0.12	0.25	99.1	0.3	0.6
	STFX	0.008~0.25	0.03	0.06	100.0	0.0	0.0
	PCG	$\leq$ 0.03~4.0	0.06	1.0	52.3	40.2	7.5
	ABPC	$\leq$ 0.03~8.0	0.06	2.0	—	—	—
	CVA/AMPC	$\leq$ 0.03~8.0	0.06	1.0	99.3	0.6	0.1
	CCL	0.06~>64	1.0	64	51.0	5.3	43.7
	CTM	$\leq$ 0.03~16	0.25	4.0	61.3	12.1	26.6
	CFDN	$\leq$ 0.03~32	0.25	4.0	59.1	11.8	29.1
	CPDX	$\leq$ 0.03~32	0.5	2.0	56.1	22.6	21.3
	CTRX	$\leq$ 0.03~4.0	0.25	1.0	97.3	2.3	0.4
	PAPM	$\leq$ 0.008~0.5	$\leq$ 0.008	0.12	99.3	0.7	0.0
	IPM	$\leq$ 0.008~1.0	0.015	0.25	84.2	15.7	0.1
	MINO	$\leq$ 0.03~16	4.0	8.0	40.2	30.7	29.1
	CAM	$\leq$ 0.03~>64	32	>64	19.4	5.9	74.7
	AZM	$\leq$ 0.03~>16	>16	>16	18.3	4.9	76.8
	TEL	$\leq$ 0.008~4.0	0.03	0.12	99.7	0.2	0.1
	VCM	$\leq$ 0.12~0.5	0.25	0.5	100.0	0.0	0.0

μ g/mL) を判定した。

なお CLSI に記載のない薬剤に関しては、類似薬のブレイクポイントおよび日本化学療法学会による算出を参考に設定した。

結 果

1. 抗菌活性

1) グラム陽性球菌

グラム陽性球菌に対する成績を Table 4~Table 7 に示す。*Streptococcus pyogenes* の各種抗菌薬に対する感性率は CPFX (86.8%), MINO (90.4%), CAM (76.8%), AZM (74.5%) を除いて、すべて 98% 以上と高い感性率が示された。STFX に対す

る耐性株は認められなかったが、その他の FQs に対する耐性株は 6 株から 8 株存在した。これらの FQs 耐性株では成績には示さないがキノロン耐性決定領域 (QRDR) の変異によるものであった (Table 4)。

S. pneumoniae の FQs に対する感性率は CPFX (87.0%) を除いて 98% 以上と高く、MIC₉₀ は 0.06~2.0 μ g/mL であった。なかでも STFX の MIC₉₀ は 0.06 μ g/mL であり最も高い抗菌活性を示した。

また、FQs 以外の抗菌薬である VCM, TEL, CVA/AMPC, PAPM, CTRX に対する感性率は各々 100%, 99.7%, 99.3%, 99.3%, 97.3% と高く、IPM は 84.2% とやや低い感性率であった。

Table 5. *In vitro* activities of drugs against clinical isolates and percentages of isolates susceptible to test drugs on the basis of CLSI.

Species (Number of strains)	Antimicrobial agents	MIC ($\mu\text{g/mL}$)			Susceptibility (%)		
		MIC range	MIC ₅₀	MIC ₉₀	Susceptible	Intermediate	Resistant
Methicillin-susceptible <i>Staphylococcus aureus</i> MSSA(736)	LVFX	$\leq 0.03 \sim > 64$	0.12	0.5	93.2	1.0	5.8
	CPFX	$\leq 0.03 \sim > 64$	0.5	1.0	90.2	2.3	7.5
	TFLX	$0.004 \sim > 16$	0.03	0.06	93.3	3.2	3.5
	STFX	$\leq 0.002 \sim 16$	0.03	0.06	99.3	0.4	0.3
	ABPC	$\leq 0.06 \sim 64$	1.0	4.0	39.7	0.0	60.3
	CVA/AMPC	$\leq 0.06 \sim 4.0$	0.5	1.0	100.0	0.0	0.0
	CCL	$0.5 \sim 16$	2.0	4.0	99.9	0.1	0.0
	CTM	$0.25 \sim 4.0$	1.0	1.0	94.8	4.9	0.3
	CFDN	$\leq 0.06 \sim 4.0$	0.25	0.5	99.7	0.2	0.1
	CPDX	$\leq 0.06 \sim 8.0$	2.0	4.0	61.5	37.8	0.7
	CTRX	$1.0 \sim 16$	4.0	4.0	99.9	0.1	0.0
	PAPM	$\leq 0.06 \sim 0.12$	≤ 0.06	≤ 0.06	100.0	0.0	0.0
	IPM	$\leq 0.06 \sim 0.12$	≤ 0.06	≤ 0.06	100.0	0.0	0.0
	MINO	$\leq 0.06 \sim 16$	≤ 0.06	0.12	99.5	0.4	0.1
	CAM	$\leq 0.06 \sim > 64$	0.25	> 64	76.4	1.2	22.4
	AZM	$0.25 \sim > 64$	2.0	> 64	76.4	0.1	23.5
	TEL	$\leq 0.06 \sim > 64$	0.12	0.12	97.0	0.3	2.7
	VCM	$0.25 \sim 2.0$	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0
Methicillin-resistant <i>Staphylococcus aureus</i> MRSA(744)	LVFX	$0.12 \sim > 64$	16	> 64	5.8	0.7	93.5
	CPFX	$0.06 \sim > 64$	64	> 64	5.6	0.2	94.2
	TFLX	$0.015 \sim > 16$	> 16	> 16	7.4	21.0	71.6
	STFX	$0.015 \sim 32$	1.0	8.0	55.2	10.8	34.0
	ABPC	$0.5 \sim 128$	32	64	0.0	0.0	100.0
	CVA/AMPC	$0.12 \sim > 64$	32	64	3.1	0.0	96.9
	CCL	$0.5 \sim > 128$	> 128	> 128	1.9	1.7	96.4
	CTM	$0.5 \sim > 128$	> 128	> 128	0.3	3.2	96.8
	CFDN	$0.12 \sim > 128$	> 128	> 128	1.1	1.1	97.8
	CPDX	$2.0 \sim > 128$	> 128	> 128	0.1	0.2	99.7
	CTRX	$2.0 \sim > 128$	> 128	> 128	0.8	7.3	91.9
	PAPM	$\leq 0.06 \sim 128$	16	64	15.1	7.1	77.8
	IPM	$\leq 0.06 \sim > 128$	32	64	13.2	3.2	83.6
	MINO	$\leq 0.06 \sim 16$	8.0	16	35.2	36.7	28.1
	CAM	$\leq 0.06 \sim > 64$	> 64	> 64	4.4	0.2	95.4
	AZM	$0.12 \sim > 64$	> 64	> 64	4.3	0.0	95.7
	TEL	$\leq 0.06 \sim > 64$	> 64	> 64	13.3	0.1	86.6
	VCM	$0.25 \sim 2.0$	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0

これら以外の抗菌薬に対しては感性率 18.3%~61.3%と低い値が示された。特にマクロライド系に対しては80%強が中等度耐性も含め耐性株であった (Table 4)。PSSP, ペニシリン中間耐性 *S. pneumoniae* (PISP), PRSPの割合は、それぞれ 52.3%, 40.2%, 7.5%であり、また PRSPにおける CTRX 以外のセフェム系抗菌薬に対する耐性率は90%以上と高い値が示された (成績未提示)。

メチシリン感性 *Staphylococcus aureus* (MSSA) における FQs の MIC₉₀ は 0.06~1.0 $\mu\text{g/mL}$ であり、FQs 感性率は 90.2~99.3% で、その中では STFX に対する感性率が最も高かった。FQs 以外の抗菌薬の多くも 90% 以上の感性率を示したが、ABPC で耐性率 60.3% と半数以上の株が耐性を示した。

また、CAM, AZM, CPDX の感性率は各々 76.4%, 76.4%, 61.5% とこれらの薬剤では 80% 以下の感性率であった (Table 5)。

FQs のメチシリン耐性 *S. aureus* (MRSA) に対する MIC₉₀ は、STFX の 8.0 $\mu\text{g/mL}$ 以外は $>16 \mu\text{g/mL}$ あるいは $>64 \mu\text{g/mL}$ であった。FQs 感性率は 5.6~55.2% でほとんどが耐性株であった。FQs 以外の抗菌薬においては、VCM を除くすべての抗菌薬に対し 0.0%~35.2% の低い感性率が示された。VCM 耐性株は認められなかった (Table 5)。

メチシリン感性コアグラエゼ陰性 *Staphylococci* (MSCNS) に対する FQs の MIC₉₀ は 0.12~4.0 $\mu\text{g/mL}$ で、また FQs に対する感性率は 87.2~99.3% であった。これは CAM の 79.9%, AZM の 79.5% に比べやや高値であった。その他の抗菌薬に対す

Table 6. *In vitro* activities of drugs against clinical isolates and percentages of isolates susceptible to test drugs on the basis of CLSI.

Species (Number of strains)	Antimicrobial agents	MIC ($\mu\text{g/mL}$)			Susceptibility (%)		
		MIC range	MIC ₅₀	MIC ₉₀	Susceptible	Intermediate	Resistant
Methicillin-susceptible coagulase-negative Staphylococci	LVFX	0.06~>64	0.12	2.0	87.3	3.2	9.5
	CPFX	0.06~>64	0.12	4.0	87.2	1.8	11.0
	TFLX	0.015~>16	0.06	4.0	88.1	1.8	10.1
	STFX	0.008~8.0	0.015	0.12	99.3	0.3	0.4
	ABPC	≤ 0.06 ~32	0.12	0.5	86.6	0.0	13.4
	CVA/AMPC	≤ 0.06 ~1.0	0.12	0.25	100	0.0	0.0
	CCL	≤ 0.06 ~4.0	0.5	1.0	100.0	0.0	0.0
	CTM	≤ 0.06 ~2.0	0.5	0.5	99.6	0.4	0.0
	CFDN	≤ 0.06 ~8.0	≤ 0.06	0.12	99.1	0.2	0.7
	CPDX	0.12~16	0.5	2.0	98.1	0.8	1.1
	MSCNS(536)	0.25~32	1.0	4.0	99.4	0.6	0.0
	PAPM	≤ 0.06	≤ 0.06	≤ 0.06	100.0	0.0	0.0
	IPM	≤ 0.06 ~4.0	≤ 0.06	≤ 0.06	100.0	0.0	0.0
	MINO	≤ 0.06 ~16	≤ 0.06	0.25	98.7	0.4	0.9
	CAM	≤ 0.06 ~>64	0.25	>64	79.9	0.2	19.9
Methicillin-resistant coagulase-negative Staphylococci	AZM	≤ 0.06 ~>64	0.5	>64	79.5	0.0	20.5
	TEL	≤ 0.06 ~>64	≤ 0.06	0.25	95.7	0.2	4.1
	VCM	≤ 0.12 ~4.0	1.0	2.0	100.0	0.0	0.0
	LVFX	0.06~>64	4.0	16	28.6	14.8	56.6
	CPFX	0.06~>64	4.0	64	27.9	9.3	62.8
	TFLX	0.015~>16	4.0	>16	30.1	15.8	54.1
	STFX	0.008~4.0	0.12	0.5	97.9	1.8	0.3
	ABPC	≤ 0.06 ~128	4.0	16	5.7	0.0	94.3
	CVA/AMPC	≤ 0.06 ~>64	2.0	16	80.7	0.0	19.3
	CCL	0.5~>128	8.0	64	55.9	19.7	24.4
	CTM	0.25~>128	2.0	8.0	33.4	39.7	26.9
	CFDN	≤ 0.06 ~>128	4.0	>128	25.0	11.9	63.1
	CPDX	≤ 0.06 ~>128	16	>128	9.5	11.8	78.7
	CTR	0.25~>128	16	>128	31.5	48.2	20.3
	PAPM	≤ 0.06 ~>128	0.5	32	78.6	3.9	17.5
MRCNS(724)	IPM	≤ 0.06 ~>128	0.5	32	77.5	2.7	19.8
	MINO	≤ 0.06 ~16	0.12	0.5	92.7	2.3	5.0
	CAM	≤ 0.06 ~>64	>64	>64	32.6	0.0	67.4
	AZM	0.12~>64	>64	>64	32.2	0.0	67.8
	TEL	≤ 0.06 ~>64	0.25	>64	60.8	1.1	38.1
	VCM	0.25~4.0	1.0	2.0	100.0	0.0	0.0

る感性率は86.6%~100%であった。FQs中ではSTFXが最も強い抗菌活性を示した (Table 6)。

メチシリン耐性コアグラウゼ陰性Staphylococci (MRCNS) における各種抗菌薬のMIC₉₀は、MRSAに比べ全体的に低値でまた感性率も高かった。FQsのMIC₉₀は0.5~>16 $\mu\text{g/mL}$ で、感性率は27.9~97.9%であった。STFXのMIC₉₀は0.5 $\mu\text{g/mL}$ で、被験抗菌薬の中でMINOと並び最も低く、感性率は97.9%であった。VCM耐性株は認められなかった (Table 6)。

*Enterococcus faecalis*のFQsに対する感性率は70.4%~77.5%であった。100%の感性率を示したのはABPC、CVA/AMPCおよびVCMであった (Table 7)。

*Enterococcus faecium*の各種抗菌薬に対する感

性率は、VCM (100%)、MINO (48.7%)、STFX (41.7%) およびTEL (38.4%) を除いておおそ15%以下であり、耐性株の占める割合が高かった (Table 7)。

2) グラム陰性球菌

グラム陰性球菌の成績をTable 8に示す。*Moraxella catarrhalis*に対するFQsのMIC₉₀は、0.015~0.06 $\mu\text{g/mL}$ と強い抗菌活性が示された。534株中FQs耐性株は認められなかった。またABPCに対する感性率は15.2%であり、CVA/AMPC耐性株は認められなかったことから耐性株はすべて β -ラクタマーゼ産生株と推定された。その他の抗菌薬に対する感性率はCTMの86.1%を除きすべて95%以上であった。

Table 7. *In vitro* activities of drugs against clinical isolates and percentages of isolates susceptible to test drugs on the basis of CLSI.

Species (Number of strains)	Antimicrobial agents	MIC (μ g/mL)			Susceptibility (%)		
		MIC range	MIC ₅₀	MIC ₉₀	Susceptible	Intermediate	Resistant
<i>Enterococcus faecalis</i> (683)	LVFX	0.25~>64	1.0	64	74.1	0.1	25.8
	CPFX	0.25~>64	1.0	32	70.4	3.7	25.9
	TFLX	0.06~>16	0.25	>16	74.2	0.2	25.6
	STFX	0.03~8.0	0.12	2.0	77.5	18.4	4.1
	ABPC	0.25~4.0	1.0	2.0	100.0	0.0	0.0
	CVA/AMPC	0.12~2.0	0.5	1.0	100.0	0.0	0.0
	CCL	16~>128	64	64	0.0	0.4	99.6
	CTM	16~>128	128	>128	0.0	0.0	100.0
	CFDN	0.25~>128	4.0	32	4.0	21.0	75.0
	CPDX	0.5~>128	>128	>128	—	—	—
	CTRX	1.0~>128	>128	>128	—	—	—
	PAPM	0.5~16	2.0	4.0	—	—	—
	IPM	0.5~8.0	1.0	2.0	—	—	—
	MINO	≤0.06~16	8.0	16	37.8	51.8	10.4
	CAM	≤0.06~>64	>64	>64	36.2	0.4	63.4
	AZM	0.5~>64	>64	>64	5.6	9.0	85.4
	TEL	≤0.06~>64	0.5	4.0	65.9	24.1	10.0
	VCM	0.5~4.0	1.0	2.0	100.0	0.0	0.0
<i>Enterococcus faecium</i> (552)	LVFX	0.25~>64	32	>64	10.5	9.2	80.3
	CPFX	0.12~>64	64	>64	6.9	4.2	88.9
	TFLX	0.03~>16	>16	>16	7.2	6.7	86.1
	STFX	0.015~16	2.0	4.0	41.7	37.8	20.5
	ABPC	≤0.06~>128	64	>128	13.8	0.0	86.2
	CVA/AMPC	≤0.06~>64	64	>64	14.7	4.0	81.3
	CCL	1.0~>128	>128	>128	0.9	0.9	98.2
	CTM	4.0~>128	>128	>128	0.0	0.0	100.0
	CFDN	0.5~>128	>128	>128	0.5	0.4	99.1
	CPDX	0.5~>128	>128	>128	—	—	—
	CTRX	1.0~>128	>128	>128	—	—	—
	PAPM	≤0.06~>128	>128	>128	—	—	—
	IPM	≤0.06~>128	>128	>128	—	—	—
	MINO	≤0.06~32	8.0	16	48.7	23.8	27.5
	CAM	≤0.06~>64	>64	>64	11.6	5.4	83.0
	AZM	0.25~>64	>64	>64	4.7	1.3	94.0
	TEL	≤0.06~>64	4.0	8.0	38.4	44.9	16.7
	VCM	0.25~4.0	0.5	1.0	100.0	0.0	0.0

*N. gonorrhoeae*に対する FQs の MIC₉₀ は、
0.25~>32 μ g/mL で、感性率は 11.8~13.6% とほとんどの株が耐性を示した。STFX の MIC₉₀ は 0.25 μ g/mL と既存の FQs に比べ良好な抗菌活性が示された。他の抗菌薬の MIC₉₀ は、CTRX が 0.12 μ g/mL、AZM が 1.0 μ g/mL、CFDN が 0.5 μ g/mL、MINO が 0.5 μ g/mL、CAM が 2.0 μ g/mL、ABPC が 4.0 μ g/mL、CVA/AMPC が 4.0 μ g/mL であった。多くの株は ABPC と CVA/AMPC に耐性でペニシラーゼ非産生ペニシリン耐性株 (NPPNG) と推定される。またこれらの NPPNG 株は第三世代セフェムの CTX に対しては 92.3%、CTRX においては 100% の感性率であった。CAZ に対する感性率は 54.5% であった。MINO に対しては約 50% の株が中間耐性を示し、感性率は 44.5% であった。

3) グラム陰性桿菌

グラム陰性桿菌に対する成績を Table 9~Table 14 に示す。*E. coli* に対する FQs の MIC₉₀ は 1.0~32 μ g/mL であり、STFX (91.8%) を除き感性率は 73.6%~73.8% で中間耐性を含め約 30% の株が耐性を示した。この耐性率はセフェム系抗菌薬である CTM に対する耐性率 (12.8%) より高値であった (Table 9)。*K. pneumoniae* に対する FQs の MIC₉₀ は 0.12~0.25 μ g/mL であり、FQs に対する感性率は 97.1~99.2% で、IPM、PAPM について高い感性率が示された (Table 9)。

Citrobacter spp., *Enterobacter* spp. に対する FQs の MIC₉₀ はそれぞれ 0.5~1.0 μ g/mL、0.25~

Table 8. *In vitro* activities of drugs against clinical isolates and percentages of isolates susceptible to test drugs on the basis of CLSI.

Species (Number of strains)	Antimicrobial agents	MIC (μ g/mL)			Susceptibility (%)		
		MIC range	MIC ₅₀	MIC ₉₀	Susceptible	Intermediate	Resistant
<i>Moraxella catarrhalis</i> (534)	LVFX	0.008~2.0	0.03	0.06	100.0	0.0	0.0
	CPFX	0.015~1.0	0.03	0.06	100.0	0.0	0.0
	TFLX	0.004~0.25	0.015	0.015	100.0	0.0	0.0
	STFX	0.002~0.12	0.015	0.015	100.0	0.0	0.0
	ABPC	$\leq 0.06 \sim 16$	2.0	8.0	15.2	0.0	84.8
	CVA/AMPC	$\leq 0.03 \sim 4.0$	0.12	0.25	100.0	0.0	0.0
	CCL	$\leq 0.06 \sim 16$	1.0	8.0	95.3	4.7	0.0
	CTM	0.12~8.0	1.0	2.0	86.1	12.2	1.7
	CFDN	$\leq 0.06 \sim 8.0$	0.12	0.25	99.6	0.0	0.4
	CPDX	$\leq 0.06 \sim 4.0$	1.0	2.0	97.2	2.8	0.0
	CAZ	$\leq 0.06 \sim 1.0$	≤ 0.06	0.25	100.0	0.0	0.0
	CTX	$\leq 0.06 \sim 2.0$	0.5	1.0	100.0	0.0	0.0
	PAPM	$\leq 0.06 \sim 2.0$	≤ 0.06	≤ 0.06	100.0	0.0	0.0
	IPM	$\leq 0.06 \sim 2.0$	≤ 0.06	≤ 0.06	100.0	0.0	0.0
	MINO	$\leq 0.06 \sim 0.5$	≤ 0.06	0.12	100.0	0.0	0.0
	CAM	$\leq 0.015 \sim > 32$	0.12	0.25	99.1	0.2	0.7
<i>Neisseria gonorrhoeae</i> (110)	AZM	$\leq 0.015 \sim > 16$	0.06	0.12	99.4	0.0	0.6
	TEL	$\leq 0.015 \sim > 32$	0.12	0.25	99.8	0.0	0.2
	LVFX	$\leq 0.015 \sim 32$	8.0	16	13.6	0.0	86.4
	CPFX	$\leq 0.015 \sim > 32$	32	>32	11.8	1.8	86.4
	TFLX	$\leq 0.015 \sim 32$	8.0	16	11.8	1.8	86.4
	STFX	$\leq 0.015 \sim 0.5$	0.25	0.25	—	—	—
	ABPC	0.12~>32	2.0	4.0	0.0	37.3	62.7
	CVA/AMPC	0.25~4.0	2.0	4.0	0.0	30.0	70.0
	CCL	0.5~32	8.0	32	—	—	—
	CTM	0.06~16	2.0	8.0	—	—	—
	CFDN	$\leq 0.03 \sim 1.0$	0.12	0.5	—	—	—
	CPDX	1.0~>32	32	>32	—	—	—
	CAZ	$\leq 0.03 \sim 4.0$	0.5	2.0	54.5	0.0	45.5
	CTX	$\leq 0.03 \sim 1.0$	0.12	1	92.3	0.0	7.7
	CTRX	$\leq 0.03 \sim 0.12$	0.03	0.12	100.0	0.0	0.0
	MINO	$\leq 0.03 \sim 8.0$	0.5	0.5	44.5	51.0	4.5
	CAM	$\leq 0.03 \sim > 32$	1.0	2.0	—	—	—
	AZM	$\leq 0.03 \sim 32$	0.5	1.0	—	—	—

1.0 μ g/mL であり, FQs に対する感性率は *Citrobacter* spp. で 90.9~95.1%, *Enterobacter* spp. で 91.6~95.4% であった。これらは IPM, PAPM について高い感性率であった (Table 10)。 *Proteus mirabilis* における FQs の MIC₉₀ は 1.0~8.0 μ g/mL であり, 感性率は 75.7~93.6% であった。MINO に対する本菌の感性率は 6.4% でほとんどが耐性株であった。また ST および CP に対する感性率も 70.0%, 74.6% でありやや低い値であった。他の抗菌薬の感性率はほぼ FQs と同じであった (Table 11)。

インドール陽性 *Proteus* 属における FQs の MIC₉₀ は 0.12~1.0 μ g/mL で, 感性率は 91.5~97.6% であった。FQs 以外の抗菌薬に対する感性率は, PAPM (100%), IPM (99.6%), CTX (97.4%), CAZ (96.7%) を除いて 4.3%~80.7% であった

(Table 11)。

Serratia marcescens に対する FQs の MIC₉₀ は 0.5~2.0 μ g/mL であった。感性率は 83.6~96.0% であり, IPM, PAPM, CAZ について高い感性率を示した。また, セフェム系抗菌薬の MIC₉₀ は CAZ, CTX および CPDX の第 3 世代注射用セフェムを除き >128 μ g/mL で感性率も 5% 以下とほとんどの菌株は耐性を示した (Table 12)。

Salmonella spp. に対する FQs の MIC₉₀ は 0.03~0.06 μ g/mL であり強い抗菌活性が示された。また感性率も 98.6~100% と高い感性率が示された。FQs 以外でもほとんどの抗菌薬で 90% 以上の高い感性率が示された (Table 12)。

Haemophilus influenzae に対する FQs の MIC₉₀ は 0.004~0.015 μ g/mL であり強い抗菌活性が示された。675 株中 1 株が STFX 以外の FQs に耐性を

Table 9. *In vitro* activities of drugs against clinical isolates and percentages of isolates susceptible to test drugs on the basis of CLSI.

Species (Number of strains)	Antimicrobial agents	MIC (μ g/mL)			Susceptibility (%)		
		MIC range	MIC ₅₀	MIC ₉₀	Susceptible	Intermediate	Resistant
<i>Escherichia coli</i> (743)	LVFX	0.015~64	0.06	16	73.8	2.8	23.4
	CPFX	0.004~>64	0.015	32	73.8	0.4	25.8
	TFLX	0.004~>16	0.015	>16	73.6	0.7	25.7
	STFX	0.004~8	0.015	1.0	91.8	6.5	1.7
	ABPC	0.5~>128	4.0	>128	59.4	1.7	38.9
	CVA/AMPC	0.5~>64	4.0	16	76.6	15.9	7.5
	CCL	$\leq 0.12 \sim >128$	2.0	128	84.7	1.6	13.7
	CTM	$\leq 0.06 \sim >128$	0.12	8.0	87.2	1.5	11.3
	CFDN	$\leq 0.06 \sim >128$	0.25	32	85.5	1.6	12.9
	CPDX	$\leq 0.06 \sim >128$	0.5	64	86.5	0.4	13.1
	CAZ	$\leq 0.06 \sim 128$	0.12	1.0	96.2	1.6	2.2
	CTX	$\leq 0.06 \sim >128$	≤ 0.06	4.0	91.3	2.1	6.6
	PAPM	$\leq 0.06 \sim 1.0$	0.12	0.25	100.0	0.0	0.0
	IPM	$\leq 0.06 \sim 1.0$	0.12	0.25	100.0	0.0	0.0
	MINO	0.12~128	0.5	4.0	92.7	4.1	3.2
	CP	1.0~>128	8.0	16	84.9	7.7	7.4
	ST	0.25~>128	2.0	>128	59.2	0.0	40.8
<i>Klebsiella pneumoniae</i> (663)	LVFX	0.008~64	0.06	0.25	98.0	0.8	1.2
	CPFX	0.008~>64	0.03	0.25	97.4	0.8	1.8
	TFLX	0.004~>16	0.03	0.25	97.1	0.9	2.0
	STFX	0.008~16	0.03	0.12	99.2	0.6	0.2
	ABPC	1.0~>128	32	64	4.8	17.4	77.8
	CVA/AMPC	1.0~>64	2.0	8.0	94.0	3.7	2.3
	CCL	0.25~>128	1.0	2.0	95.0	0.3	4.7
	CTM	$\leq 0.06 \sim >128$	0.25	1.0	92.9	1.8	5.3
	CFDN	$\leq 0.06 \sim >128$	0.12	0.25	94.7	0.8	4.5
	CPDX	$\leq 0.06 \sim >128$	0.12	0.5	95.2	0.3	4.5
	CAZ	$\leq 0.06 \sim >128$	0.12	0.5	97.4	0.2	2.4
	CTX	$\leq 0.06 \sim >128$	≤ 0.06	0.12	96.2	1.1	2.7
	PAPM	$\leq 0.06 \sim 64$	0.12	0.25	99.7	0.1	0.2
	IPM	$\leq 0.06 \sim 32$	0.25	0.5	99.8	0.0	0.2
	MINO	$\leq 0.06 \sim >128$	1.0	4.0	91.6	3.4	5.0
	CP	0.5~>128	4.0	32	88.4	0.7	10.9
	ST	1.0~>128	4.0	16	29.1	0.0	70.9

示した (LVFX MIC=8.0 μ g/mL) (Table 13)。また成績には示していないが、 β -ラクタマーゼ非産生アンピシリン耐性 (BLNAR) インフルエンザ桿菌は675株中338株 (50.1%) 存在し、その338株のうち311株 (92.0%) が、第三世代経口セフェムCFDNに耐性を示した。また β -ラクタマーゼ産生アンピシリン耐性 (BLPAR) 株は48株 (7.1%) 存在し、そのうち、CVA/AMPCに対する耐性株 (CVA/AMPC MIC $\geq$ 8.0 μ g/mL) は20株存在した。

Acinetobacter spp. に対する FQs の MIC₉₀ は 0.5~4.0 μ g/mL で、感性率は 88.3~93.8% であった。MINO, IPM, PAPM, CAZ に対する感性率はそれぞれ 97.5%, 96.3%, 94.8%, 88.0% と高値であった。その他の抗菌薬に対する感性率はすべて 50% 以下であった (Table 13)。一方カルバペネム耐性株は 598 株中 16 株 (2.7%) 存在した。16 株

のうち 14 株は *Acinetobacter baumannii* であり、これらは特定の施設に集中していた (成績未提示)。

尿路感染症由来 *Pseudomonas aeruginosa* に対する FQs の MIC₉₀ は 4.0~64 μ g/mL で、また感性率は 72.3~78.6% であった。FQs の中では STFX が最も高い感性率を示した。80% 以上の感性率を示した抗菌薬は、PIPC (92.0%), AMK (92.0%), CAZ (86.6%), MEPM (86.2%), GM (85.9%) であった (Table 14)。

呼吸器感染由来 *P. aeruginosa* に対する FQs の MIC₉₀ は、2.0~16 μ g/mL で、感性率は 79.2~87.1% であった。FQs 以外の抗菌薬に対する感性率は、AMK において 97.3% と最も高く、続いて PIPC で 93.9%, GM で 91.2% であった (Table 14)。CPFX, IPM, AMK 耐性を示す多剤耐性 (MDRP)

Table 10. *In vitro* activities of drugs against clinical isolates and percentages of isolates susceptible to test drugs on the basis of CLSI.

Species (Number of strains)	Antimicrobial agents	MIC (μ g/mL)			Susceptibility (%)		
		MIC range	MIC ₅₀	MIC ₉₀	Susceptible	Intermediate	Resistant
<i>Citrobacter</i> spp. (573)	LVFX	0.015~>64	0.06	1.0	92.7	2.2	5.1
	CPFX	0.004~>64	0.03	0.5	92.0	1.9	6.1
	TFLX	0.004~>16	0.06	1.0	90.9	1.8	7.3
	STFX	0.004~8.0	0.03	0.5	95.1	3.2	1.7
	ABPC	1.0~>128	32	>128	10.3	26.0	63.7
	CVA/AMPC	0.5~>64	32	64	26.4	10.1	63.5
	CCL	0.5~>128	32	>128	27.4	7.9	64.7
	CTM	≤0.06~>128	2.0	128	46.2	12.8	41.0
	CFDN	≤0.06~>128	1.0	128	50.1	7.3	42.6
	CPDX	≤0.06~>128	2.0	>128	51.5	16.7	31.8
	CAZ	≤0.06~>128	0.5	128	76.4	2.0	21.6
	CTX	≤0.06~>128	0.12	64	76.8	8.0	15.2
	PAPM	≤0.06~16	0.25	0.5	99.8	0.0	0.2
	IPM	≤0.06~8.0	0.25	1.0	99.8	0.2	0.0
	MINO	0.12~>128	1.0	8.0	89.9	5.6	4.5
	CP	1.0~>128	8.0	32	73.1	14.9	12.0
	ST	0.5~>128	2.0	16	69.1	0.0	30.9
<i>Enterobacter</i> spp. (681)	LVFX	≤0.002~>64	0.03	1.0	94.3	1.0	4.7
	CPFX	≤0.002~>64	0.015	0.5	92.1	2.2	5.7
	TFLX	≤0.001~>16	0.03	1.0	91.6	2.7	5.7
	STFX	≤0.001~32	0.015	0.25	95.4	1.2	3.4
	ABPC	0.25~>128	32	>128	9.1	24.1	66.8
	CVA/AMPC	0.12~>64	32	64	5.9	4.8	89.3
	CCL	≤0.12~>128	128	>128	5.1	5.5	89.4
	CTM	≤0.06~>128	8.0	>128	21.3	11.3	67.4
	CFDN	≤0.06~>128	8.0	>128	21.3	12.3	66.4
	CPDX	≤0.06~>128	2.0	>128	54.9	10.2	34.9
	CAZ	≤0.06~>128	0.25	64	78.7	1.9	19.4
	CTX	≤0.06~>128	0.25	128	77.5	5.9	16.6
	PAPM	≤0.06~32	0.5	1.0	99.7	0.0	0.3
	IPM	≤0.06~16	0.5	2.0	99.7	0.2	0.1
	MINO	0.25~>128	2.0	4.0	90.2	3.3	6.5
	CP	2.0~>128	8.0	32	76.4	12.7	10.9
	ST	0.5~>128	4.0	16	34.7	0.0	65.3

株は尿路由来で5.6% (33株), 呼吸器由来で1.8% (12株) であった。MDRP株のうちメタロβ-ラクタマーゼ産生株の割合は, 尿路由来株で66.7%, 呼吸器由来株で83.3%であった。

考察

FQsに対してMSSAは, MRSAに比べ高い感性率を示した。MRSAにおいては著しくFQsに対する感性率が高かったが, これは1992年以来行われている本サーベイランス過去7回の傾向と同様であった。MRSAは院内感染型のMRSA (Hospital-associated MRSA) はほとんどが多剤耐性のPandemic cloneで占められ (例えば日本ではMultilocus Sequence Typing ST5 SCCmec type II PFGE type USA100), さらに院内の抗菌選択圧に

よりフルオロキノロン耐性株が優位に選択され広がっていると考えられる⁷⁾。

しかしながら世界的にはメチシリン感性株においてもFQs耐性が増加傾向にあるとの報告も見られ⁸⁾, 今後の推移を監視することは重要である。

*S. pyogenes*についてはCPFX (86.8%)を除いて, FQsの感性率は98%以上と高い感性率が示された。一方, マクロライド系抗菌薬であるCAM中等度耐性を含めた耐性株の割合は1996; 5.6%, 1998; 6.5%, 2000; 7.5%, 2002; 9.0%, 2004; 14.8%, 2007; 23.2%, 同様にAZM耐性株の割合は, 2000; 7.9%, 2002; 9.2%, 2004; 13.2%, 2007; 25.5%と経年的に明確な増加が示されている。マクロライド耐性菌は特定のT抗原タイプに集中し, クローンによる伝播が行われやすいことが報告されている⁹⁾。また, マクロライド耐性株の多くの

Table 11. *In vitro* activities of drugs against clinical isolates and percentages of isolates susceptible to test drugs on the basis of CLSI.

Species (Number of strains)	Antimicrobial agents	MIC (μ g/mL)			Susceptibility (%)		
		MIC range	MIC ₅₀	MIC ₉₀	Susceptible	Intermediate	Resistant
<i>Proteus mirabilis</i> (547)	LVFX	0.008~>64	0.06	4.0	88.8	3.5	7.7
	CPFX	0.015~>64	0.03	4.0	81.4	6.0	12.6
	TFLX	≤ 0.001 ~>16	0.12	8.0	75.7	3.5	20.8
	STFX	0.015~>64	0.03	1.0	93.6	2.7	3.7
	ABPC	0.12~>128	1.0	>128	78.4	2.6	19.0
	CVA/AMPC	0.12~64	1.0	8.0	95.4	3.3	1.3
	CCL	0.25~>128	1.0	>128	86.5	0.2	13.3
	CTM	≤ 0.06 ~>128	0.25	64	86.5	0.3	13.2
	CFDN	≤ 0.06 ~>128	≤ 0.06	16	87.0	0.0	13.0
	CPDX	≤ 0.06 ~>128	≤ 0.06	64	86.8	0.2	13.0
	CAZ	≤ 0.06 ~32	≤ 0.06	0.12	99.8	0.0	0.2
	CTX	≤ 0.06 ~>128	≤ 0.06	16	89.6	4.0	6.4
	PAPM	≤ 0.06 ~4.0	0.5	1.0	100.0	0.0	0.0
	IPM	≤ 0.06 ~4.0	1.0	2.0	100.0	0.0	0.0
	MINO	2.0~>128	16	32	6.4	37.1	56.5
	CP	1.0~>128	8.0	64	74.6	11.9	13.5
	ST	0.5~>128	2.0	64	70.0	0.0	30.0
Indole-positive <i>Proteus</i> group (508)	LVFX	0.015~>64	0.03	1.0	95.3	1.7	3.0
	CPFX	0.004~>64	0.015	0.25	94.1	1.4	4.5
	TFLX	0.015~>16	0.06	1.0	91.5	2.0	6.5
	STFX	≤ 0.001 ~32	0.015	0.12	97.6	0.6	1.8
	ABPC	0.5~>128	32	128	9.1	16.3	74.6
	CVA/AMPC	0.5~>64	32	64	33.9	12.8	53.3
	CCL	0.25~>128	>128	>128	4.3	3.6	92.1
	CTM	≤ 0.06 ~>128	16	64	23.4	5.1	71.5
	CFDN	≤ 0.06 ~>128	8.0	32	21.5	3.9	74.6
	CPDX	≤ 0.06 ~>128	0.5	8.0	80.7	7.7	11.6
	CAZ	≤ 0.06 ~>128	≤ 0.06	0.5	96.7	2.5	0.8
	CTX	≤ 0.06 ~>128	≤ 0.06	0.5	97.4	1.8	0.8
	PAPM	0.12~4.0	1.0	2.0	100.0	0.0	0.0
	IPM	0.12~8.0	2.0	4.0	99.6	0.4	0.0
	MINO	0.5~>128	4.0	16	65.7	20.5	13.8
	CP	1.0~>128	8.0	32	78.3	9.3	12.4
	ST	0.5~>128	2.0	8.0	52.2	0.0	47.8

株が上皮細胞内への侵入増殖性に関与する病原因子 *prtF1* を保有しており、細胞内に侵入した株は、ペニシリン、セフェム感性株であっても β -ラクタム系抗菌薬には反応しにくいことが臨床問題であり¹⁰⁾, *S. pyogenes* が主要原因菌である上気道感染症に対する抗菌薬の適正使用が望まれる。

S. pneumoniae におけるペニシリン中等度耐性株を含めた耐性株の割合は47.7%であった。過去のサーベイランスの結果では、PISP, PRSPの分離頻度は増加傾向を示していたが、今回の結果では、増加傾向は認められなかった。一方、*S. pneumoniae* のマクロライド耐性率に関しては、世界的には一様ではなく、国によって様々であるが、耐性株が臨床分離株の半数以上を占める国が、例えばスペイン、フランス、香港、米国などにみられ問題となっている。本邦でもこれらの国と同様

に耐性率は高い。今回のサーベイランスで得られたマクロライド耐性率は、CAM, AZMに対してそれぞれ約80%を示し、過去のサーベイランスの結果に続いて増加傾向を示した。

マクロライド耐性メカニズムには、標的である23SリボソームRNAのメチル化によって、マクロライドが作用点へ結合できなくなること、またはエフラックスポンプによる細胞質内のマクロライドの排出が主に働く。*S. pneumoniae* において主に *ermB* と *mefA* 遺伝子が耐性に関与するが、マクロライド耐性株において *ermB* 保有株でMIC値は高く、また *ermB*, *mefA* 両耐性遺伝子保有株で耐性度が上昇することが報告されている¹¹⁾。市中肺炎原因菌として非定型菌（クラミジア、マイコプラズマ、レジオネラ）の増加が問題となっており、それに対処するため経験的治療にマクロライドが

Table 12. *In vitro* activities of drugs against clinical isolates and percentages of isolates susceptible to test drugs on the basis of CLSI.

Species (Number of strains)	Antimicrobial agents	MIC (μ g/mL)			Susceptibility (%)		
		MIC range	MIC ₅₀	MIC ₉₀	Susceptible	Intermediate	Resistant
<i>Serratia marcescens</i> (654)	LVFX	0.015~>64	0.12	2.0	93.9	1.8	4.3
	CPFX	0.008~>64	0.06	2.0	87.6	6.4	6.0
	TFLX	0.008~>16	0.25	2.0	83.6	9.2	7.2
	STFX	0.008~32	0.12	0.5	96.0	2.9	1.1
	ABPC	2.0~>128	64	>128	2.4	6.8	90.8
	CVA/AMPC	2.0~>64	64	>64	0.8	2.0	97.2
	CCL	2.0~>128	>128	>128	0.3	0.0	99.7
	CTM	0.25~>128	64	>128	0.6	0.6	98.8
	CFDN	0.25~>128	32	>128	1.5	3.4	95.1
	CPDX	0.12~>128	2.0	64	57.0	12.4	30.6
	CAZ	$\leq$ 0.06~>128	0.12	1.0	96.9	1.3	1.8
	CTX	$\leq$ 0.06~>128	0.5	16	86.1	4.7	9.2
	PAPM	0.25~16	0.5	1.0	98.2	1.6	0.2
	IPM	0.25~8	1.0	2.0	99.5	0.5	0.0
	MINO	0.25~>128	2.0	4.0	93.0	4.6	2.4
	CP	2.0~>128	16	32	13.1	59.1	27.8
	ST	1.0~>128	8.0	16	2.6	0.0	97.4
<i>Salmonella</i> spp. (210)	LVFX	0.03~8.0	0.06	0.06	99.5	0.0	0.5
	CPFX	0.008~8.0	0.015	0.06	99.0	0.5	0.5
	TFLX	0.008~8.0	0.03	0.06	98.6	0.9	0.5
	STFX	0.008~0.5	0.015	0.03	100.0	0.0	0.0
	ABPC	0.5~>128	1.0	2.0	92.4	0.0	7.6
	CVA/AMPC	0.5~64	1.0	1.0	95.2	1.9	2.9
	CCL	0.5~>128	1.0	1.0	98.6	0.0	1.4
	CTM	$\leq$ 0.06~>128	0.12	0.25	98.6	0.0	1.4
	CFDN	$\leq$ 0.06~>128	0.12	0.25	98.6	0.0	1.4
	CPDX	0.12~>128	0.25	0.5	98.6	0.0	1.4
	CAZ	$\leq$ 0.06~>128	0.25	0.25	98.6	0.0	1.4
	CTX	$\leq$ 0.06~>128	$\leq$ 0.06	0.12	98.6	0.0	1.4
	PAPM	$\leq$ 0.06~0.5	0.12	0.25	100.0	0.0	0.0
	IPM	$\leq$ 0.06~0.5	0.25	0.25	100.0	0.0	0.0
	MINO	0.5~128	2.0	4.0	92.4	0.9	6.7
	CP	0.5~>128	4.0	8.0	94.3	1.9	3.8
	ST	1.0~>128	2.0	8.0	81.0	0.0	19.0

第一選択薬に推奨されていることも *S. pneumoniae* にマクロライド耐性株が蔓延する要因と考えられる¹²⁾。

S. pneumoniae における中等度耐性を含めた FQs 耐性株の割合は、CPFX (13.0%) を除き 0.0~1.2% と低く、過去のサーベイランスと比較して上昇はしていない。通常 FQs 耐性の主要メカニズムである DNA ジャイレースとトポイソメラーゼ IV の遺伝子変異は一箇所の変異では耐性度は低く、少なくとも 2 箇所以上の変異が耐性度の上昇に必要である¹³⁾。一方、エフラックスポンプの変異による FQs 耐性も知られているが、これらは CPFX などの MIC の上昇に働くが、LVFX などの FQs 耐性にはあまり関与しないとの報告もなされている¹⁴⁾。

今回のサーベイランスでは、エフラックスポンプについて検討していないが、LVFX、CPFX の

MIC が 1 μ g/mL 以上の *S. pneumoniae* 各々 401 株、461 株 (延べ 474 株) について QRDR 変異を検討した。その結果、中等度耐性を含めた LVFX 耐性株 (MIC $\geq$ 4 μ g/mL) 8 株のすべてが複数の変異を有しており、2 箇所に変異を有する株が 7 株、3 箇所に変異を有する株が 1 株存在していた。一方、CPFX 耐性株 (MIC $\geq$ 4 μ g/mL) 25 株では 1 箇所変異を有する株が 7 株、複数変異を有する株が 8 株であったが、10 株が QRDR 変異を有しておらず、CPFX の耐性にはエフラックスポンプの関与も疑われた。一方、LVFX 感性株 (MIC=1 および 2 μ g/mL) 393 株については、1 箇所変異を有する株が 22 株、複数変異を有する株は 1 株であった (以上 QRDR 変異については成績未提示)。また LVFX 耐性 8 株中 3 株はペニシリン感性であった。ペニシリン耐性と FQs 耐性がリンクしているとい

Table 13. *In vitro* activities of drugs against clinical isolates and percentages of isolates susceptible to test drugs on the basis of CLSI.

Species (Number of strains)	Antimicrobial agents	MIC (μ g/mL)			Susceptibility (%)		
		MIC range	MIC ₅₀	MIC ₉₀	Susceptible	Intermediate	Resistant
<i>Haemophilus influenzae</i> (675)	LVFX	0.004~8.0	0.015	0.015	99.9	0.0	0.1
	CPFX	0.002~16	0.008	0.015	99.9	0.0	0.1
	TFLX	0.002~16	0.008	0.015	99.7	0.0	0.3
	STFX	$\leq 0.001 \sim 0.5$	0.004	0.004	100.0	0.0	0.0
	ABPC	$\leq 0.06 \sim > 64$	2.0	8.0	42.8	20.5	36.7
	CVA/AMPC	$\leq 0.06 \sim 32$	2.0	16	67.1	0.0	32.9
	CCL	0.25~>64	4.0	8.0	91.1	5.2	3.7
	CTM	0.12~>64	2.0	16	31.6	0.0	68.4
	CFDN	$\leq 0.06 \sim 32$	2.0	8.0	45.9	0.0	54.1
	CPDX	$\leq 0.06 \sim 16$	1.0	4.0	79.4	0.0	20.6
	CAZ	$\leq 0.06 \sim 4.0$	0.25	0.5	99.9	0.0	0.1
	CTX	$\leq 0.06 \sim 4.0$	0.25	1.0	99.4	0.0	0.6
	PAPM	$\leq 0.06 \sim 8.0$	1.0	2.0	99.3	0.0	0.7
	IPM	$\leq 0.06 \sim 16$	1.0	4.0	95.6	0.0	4.4
	MINO	$\leq 0.06 \sim 8.0$	0.12	0.5	99.6	0.3	0.1
	CAM	$\leq 0.06 \sim 64$	8.0	16	81.0	17.1	1.9
<i>Acinetobacter</i> spp. (598)	AZM	0.03~16	2.0	4.0	99.3	0.0	0.7
	TEL	0.06~16	2.0	4.0	96.4	3.3	0.3
	LVFX	0.03~64	0.06	1.0	92.5	2.3	5.2
	CPFX	0.015~>64	0.12	4.0	88.3	1.5	10.2
	TFLX	0.008~>16	0.03	0.5	92.5	0.1	7.4
	STFX	0.008~16	0.03	0.5	93.8	1.9	4.3
	ABPC	$\leq 0.06 \sim > 128$	16	64	19.1	35.1	45.8
	CVA/AMPC	$\leq 0.06 \sim > 64$	16	32	40.8	34.1	25.1
	CCL	0.25~>128	64	>128	6.2	6.0	87.8
	CTM	0.25~>128	64	128	0.3	0.0	99.7
	CFDN	$\leq 0.06 \sim > 128$	4.0	16	7.9	19.0	73.1
	CPDX	0.25~>128	16	64	1.5	4.0	94.5
	CAZ	$\leq 0.06 \sim > 128$	4.0	16	88.0	5.0	7.0
	CTX	$\leq 0.06 \sim > 128$	16	32	46.7	34.6	18.7
	PAPM	$\leq 0.06 \sim 128$	0.25	1.0	94.8	0.7	4.5
	IPM	$\leq 0.06 \sim 64$	0.25	0.5	96.3	1.0	2.7
	MINO	$\leq 0.06 \sim 128$	≤ 0.06	0.25	97.5	1.3	1.2
	CP	0.25~>128	128	>128	7.4	1.1	91.5
	ST	0.5~>128	8.0	32	11.5	0.0	88.5

う報告はないが、PRSPは特定のクローンによる流行が起こりやすいという報告もあるため¹⁵⁾、今後FQs耐性株が増加していく危険性は否定できない。

通常腸内細菌科菌種のFQs感受性は非常に高く、耐性株の出現は非常に稀である。しかし*E. coli*では、我々の過去7回と今回のサーベイランスの結果、2000年以降急激にFQs耐性株の分離頻度が上昇し、2007年では*E. coli*の中等度耐性を含むFQs耐性株は、8.2~26.4%認められた。例えばLVFXを例にとると、中等度耐性を含めた耐性株の割合は1994; 2.1%, 1996; 2.5%, 1998; 3.3%, 2000; 8.2%, 2002; 11.8%, 2004; 18.8%, 2007; 26.2%とその増加は明らかである。

*E. coli*におけるFQ耐性機序は、標的酵素の変

異およびエフラックスポンプの関与であることが既に報告されており、今後も耐性株の増加が危惧される。また、*E. coli*, *K. pneumoniae*, *P. mirabilis*において、CFDN耐性株が4.5~13.0%に認められた。CFDNのような第三世代セフェム系抗菌薬耐性のメカニズムとしては、第三世代セフェム系抗菌薬分解性ESBLの産生による可能性が高い。成績には示さないが、PCR試験で、*E. coli*では64株(8.6%), *K. pneumoniae*では35株(5.3%), *P. mirabilis*では59株(10.8%)がESBL産生株であることが明らかとなった。全国的にもESBL産生株が散発的に分離されており¹⁶⁾、本サーベイランスでも同様の傾向が示されたと考えられる。特に尿路感染症で*E. coli*について分離頻度の高い*P. mirabilis*で*E. coli*より高頻度でESBL

Table 14. *In vitro* activities of drugs against clinical isolates and percentages of isolates susceptible to test drugs on the basis of CLSI.

Species (Number of strains)	Antimicrobial agents	MIC (μ g/mL)			Susceptibility (%)		
		MIC range	MIC ₅₀	MIC ₉₀	Susceptible	Intermediate	Resistant
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> UTI (589)	LVFX	$\leq 0.03 \sim > 64$	0.5	64	72.8	3.8	23.4
	CPFX	$\leq 0.03 \sim > 64$	0.25	32	75.0	1.7	23.3
	TFLX	$\leq 0.03 \sim > 16$	0.25	32	72.3	4.4	23.3
	STFX	$\leq 0.03 \sim 32$	0.12	4.0	78.6	3.4	18.0
	PIPC	$0.25 \sim > 128$	4.0	64	92.0	0.0	8.0
	CAZ	$0.12 \sim > 128$	2.0	16	86.6	3.4	10.0
	CTX	$1.0 \sim > 128$	16	> 128	12.4	54.3	33.3
	CPR	$0.5 \sim > 128$	4.0	32	70.5	13.7	15.8
	MEPM	$\leq 0.06 \sim > 128$	0.5	16	86.2	3.1	10.7
	PAPM	$0.25 \sim > 128$	8.0	32	32.9	37.6	29.5
	IPM	$0.12 \sim > 128$	1.0	16	79.5	3.0	17.5
	AZT	$\leq 0.06 \sim > 128$	4.0	32	69.8	12.4	17.8
	GM	$\leq 0.06 \sim > 128$	2.0	8.0	85.9	5.1	9.0
	AMK	$0.12 \sim > 128$	4.0	16	92.0	2.2	5.8
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> RTI (673)	LVFX	$\leq 0.03 \sim > 64$	0.5	16	79.2	6.4	14.4
	CPFX	$\leq 0.03 \sim > 64$	0.25	4.0	82.9	4.6	12.5
	TFLX	$\leq 0.03 \sim > 16$	0.25	8.0	81.0	5.2	13.8
	STFX	$\leq 0.03 \sim > 64$	0.12	2.0	87.1	5.8	7.1
	PIPC	$\leq 0.06 \sim > 128$	4.0	64	93.9	0.0	6.1
	CAZ	$0.25 \sim > 128$	2.0	16	87.8	4.5	7.7
	CTX	$0.12 \sim > 128$	16	> 128	16.0	54.1	29.9
	CPR	$0.12 \sim > 128$	4.0	32	74.6	11.7	13.7
	MEPM	$\leq 0.06 \sim > 128$	0.5	8.0	84.7	7.3	8.0
	PAPM	$\leq 0.06 \sim > 128$	8.0	32	31.1	31.2	37.7
	IPM	$\leq 0.06 \sim > 128$	2.0	32	70.6	4.7	24.7
	AZT	$\leq 0.06 \sim > 128$	4.0	32	76.1	8.7	15.2
	GM	$\leq 0.06 \sim > 128$	2.0	4.0	91.2	4.6	4.2
	AMK	$\leq 0.06 \sim > 128$	4.0	8.0	97.3	0.8	1.9

産生株が出現していることは注目に値した。さらに、これらの菌種において、第三世代セフェム系抗菌薬耐性およびFQs耐性を同時に持つ株が蔓延するようになった場合、治療上極めて困難となる。今回のサーベイランスではESBL産生株の中で、*E. coli*では47株、*K. pneumoniae*では3株、*P. mirabilis*では25株がLVFX耐性であった。今後このような傾向が広まるのかは不明であるが、クローンとして広がる危険性も十分考えられるので、動向を注意深く調べる必要がある。

多剤耐性 *Salmonella* は、*Salmonella typhimurium* DT104 において世界的に広がっていることが知られている¹⁷⁾。さらにこのようなタイプの菌株にFQs耐性が付加された株が出現し、世界的な問題となっている¹⁸⁾。本サーベイランスにおいてはABPC、CP、MINO、STの4剤に耐性を示す *Salmonella* spp. が1株認められ、LVFX耐性株 (MIC: 8.0 μ g/mL) であった。

H. influenzae では、BLPAR および BLNAR もま

た世界的に蔓延傾向にある。世界的な傾向としてBLPAR株の分離率がBLNAR株に比べ高いが、本サーベイランスではBLNAR株の分離率がBLPAR株の7倍強と世界的な傾向と異なる特徴が示され、本邦におけるアンピシリン耐性インフルエンザ桿菌の特徴となっている¹⁹⁾。またBLNARではCFDN耐性が連動していた。本邦では *H. influenzae* 感染症に対し、 β -ラクタマーゼに極めて安定な第三世代セフェム系抗菌薬が多く使用されることが多い。それ故にペニシリン結合蛋白質PBPの変異に基づくペニシリン耐性BLNAR株が容易に選択される環境が生まれ、BLNARの高分離傾向が生じたものと思われる。FQs、マクロライド系抗菌薬に対する耐性株は他国同様非常にまれであった。

P. aeruginosa におけるFQs耐性の頻度は、過去7回のサーベイランスと同様、呼吸器感染症由来に比べて尿路感染症由来で明らかに高い。FQsの感染症別使用頻度、投与量、クローン伝播など多

岐にわたる要因があると思われるが、背景因子の特定には至っていない。一方、*P. aeruginosa* では、カルバペネム系抗菌薬、アミノ配糖体、FQsに同時耐性を示す多剤耐性株による院内感染が問題となっている。本邦でも全国レベルで散発し問題となっている²⁰⁾。成績には示さないが、今回のサーベイランスにおいては、多剤耐性株は尿路感染症由来で5.6% (33株)、呼吸器感染症由来で1.8% (12株) 認められた。多剤耐性株については経年的な耐性化傾向は認められていないが、2剤耐性株は尿路感染症由来で7.8% (46株)、呼吸器感染症由来で7.4% (50株) に認められていることから、今後の耐性動向を注視していく必要がある。

またモノバクタム以外の β -ラクタム系抗菌薬を分解するメタロ β -ラクタマーゼは、その主要な遺伝子である bla_{IMP-1} が転移性であるがゆえに、*P. aeruginosa*をはじめ*S. marcescens*、*K. pneumoniae*、*Citrobacter freundii*、*A. baumannii*などいくつかの菌種に広がっている²¹⁾。今回のサーベイランスでは*P. aeruginosa*に焦点をあてて bla_{IMP-1} の存在も別に調べている。成績には示さないが、*P. aeruginosa* UTI由来で5.3%、RTI由来で2.1%存在し、全国レベルで本酵素産生菌種、菌株が広がりつつある現状が浮き彫りとなった。また16株の*Acinetobacter* spp. (14株は*A. baumannii*) がカルバペネム耐性であり、成績には示さないが特定の二つの病院に集中していたことはアウトブレイクの可能性があり、今後その広がりを監視していくことが重要と思われる。

以上、今回の感受性調査の成績から、臨床での使用が15年以上経過したFQsに対し、メチシリン耐性 *Staphylococci*, *Enterococci*, *E. coli*, *N. gonorrhoeae*, *P. aeruginosa* は耐性化傾向が示されたが、それ以外の菌種では、90%以上の高い感受性が保持されていた。今後も、各菌種における耐性菌の増加や高度耐性化を抑制するためには、

定期的に感受性動向を注視するとともに、適正な抗菌薬の使用が重要であろう。

文献

- 1) HOOPER, D. C.: Mechanisms of action and resistance of older and newer fluoroquinolones. Clin. Infect. Dis. (2 Suppl.): S24~28, 2000
- 2) CROOM, K. F. & K. L. GOA: Levofloxacin: a review of its use in the treatment of bacterial infections in the United States. Drugs 63: 2769~2802, 2003
- 3) YAMAGUCHI, K.; A. OHNO & Levofloxacin Surveillance Group: Investigation of the susceptibility trends in Japan to fluoroquinolones and other antimicrobial agents in a nationwide collection of clinical isolates: a longitudinal analysis from 1994 to 2002. Diagn. Microbiol. Infect. Dis. 52: 135~143, 2005
- 4) 山口恵三, 大野 章, 石井良和, 他: 2004年に全国77施設から分離された臨床分離株18,639株の各種抗菌薬に対する感受性サーベイランス。Jpn. J. Antibiotics 59: 428~451, 2006
- 5) SUMMERS, A. O.: Genetic linkage and horizontal gene transfer, the roots of the antibiotic multi-resistance problem. Anim. Biotechnol. 17: 125~135, 2006
- 6) Clinical and Laboratory Standards Institute: Performans standards for antimicrobial susceptibility testing; Fifteenth informational Supplement. Approved Standard M100-S18. CLSI 28: 2008
- 7) BOUCHER, H. W. & G. R. COREY: Epidemiology of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*. Clin. Infect. Dis. 46 (Suppl. 5): S344~S349, 2008
- 8) MARANGON, F. B.; D. MILLER, M. S. MUALLEM, et al.: Ciprofloxacin and levofloxacin resistance among methicillin-sensitive *Staphylococcus aureus* isolates from keratitis and conjunctivitis. Am. J. Ophthalmol. 137: 453~458, 2004
- 9) FACINELLI, B.; C. SPINACI, G. MAGI, et al.: As-

- sociation between erythromycin resistance and ability to enter human respiratory cells in group A streptococci. *Lancet* 358: 30~33, 2001
- 10) SELA, S. & A. BARZILAI: Why do we fail with penicillin in the treatment of group A *Streptococcus* infections? *Ann. Med.* 31: 303~307, 1999
- 11) FARRELL, D. J.; S. G. JENKINS, S. D. BROWN, *et al.*: Emergence and spread of *Streptococcus pneumoniae* with *erm* (B) and *mef* (A) resistance. *Emerg. Infect. Dis.* 11: 851~858, 2005
- 12) NIEDERMAN, M. S.; J. B. JR. BASS, G. D. CAMPBELL, *et al.*: Guidelines for the initial management of adults with community-acquired pneumonia: diagnosis, assessment of severity, and initial antimicrobial therapy. American Thoracic Society. Medical Section of the American Lung Association. *Am. Rev. Respir. Dis.* 148: 1418~1426, 1993
- 13) WEIGEL, L. M.; G. J. ANDERSON, R. R. FACKLAM, *et al.*: Genetic analyses of mutations contributing to fluoroquinolone resistance in clinical isolates of *Streptococcus pneumoniae*. *Antimicrob. Agents Chemother.* 45: 3517~3523, 2001
- 14) PIDDOCK, L. J.; M. JOHNSON, V. RICCI, *et al.*: Activities of new fluoroquinolones against fluoroquinolone-resistant pathogens of the lower respiratory tract. *Antimicrob. Agents Chemother.* 42: 2956~2960, 1998
- 15) FORWARD, K. R.: The epidemiology of penicillin resistance in *Streptococcus pneumoniae*. *Semin. Respir. Infect.* 14: 243~254, 1999
- 16) KOMATSU, M.; M. AIHARA, K. SHIMAKAWA, *et al.*: Evaluation of MicroScan ESBL confirmation panel for Enterobacteriaceae-producing, extended-spectrum beta-lactamases isolated in Japan. *Diagn. Microbiol. Infect. Dis.* 46: 125~130, 2003
- 17) DAVIS, M. A.; D. D. HANCOCK & T. E. BESSER: Multiresistant clones of *Salmonella enterica*: The importance of dissemination. *J. Lab. Clin. Med.* 140: 135~141, 2002
- 18) IZUMIYA, H.; K. MORI, T. KURAZONO, *et al.*: Characterization of isolates of *Salmonella enterica* serovar *typhimurium* displaying high-level fluoroquinolone resistance in Japan. *J. Clin. Microbiol.* 43: 5074~5079, 2005
- 19) TRISTRAM, S.; M. R. JACOBS, P. C. APPELBAUM: Antimicrobial resistance in *Haemophilus influenzae*. *Clin. Microbiol. Rev.* 20: 368~389, 2007
- 20) TAKEYAMA, K.; Y. KUNISHIMA, M. MATSUKAWA, *et al.*: Multidrug-resistant *Pseudomonas aeruginosa* isolated from the urine of patients with urinary tract infection. *J. Infect. Chemother.* 8: 59~63, 2002
- 21) WALSH, T. R.: The emergence and implications of metallo-beta-lactamases in Gram-negative bacteria. *Clin. Microbiol. Infect.* 11 (6 Suppl.): 2~9, 2005

In vitro susceptibilities to levofloxacin and various antibacterial
agents of 12,919 clinical isolates obtained from
72 centers in 2007

KEIZO YAMAGUCHI, AKIRA OHNO, YOSHIKAZU ISHII and KAZUHIRO TATEDA
Department of Microbiology and Infectious Diseases,
Toho University School of Medicine

MORIHIRO IWATA
Department of Clinical Laboratory, Toho University Omori Medical Center
and Levofloxacin-Surveillance Group

MAKOTO KANDA
Asahikawa City Hospital

MINORU YASUJIMA
Hirosaki University Hospital

KOUJI AKIZAWA and CHIKARA SHIMIZU
Hokkaido University Hospital

MAKOTO MIKI
Japanese Red Cross Sendai Hospital

SHINICHIROU KON, KASTUSHI NAKAMURA
and KEIKO MATSUDA
Municipal Muroran General Hospital

MASATO HAYASHI, SYUNJI OKUBO and
SYUNKOU TOYOSHIMA
Hiraka General Hospital

MAKOTO TOMINAGA
Yamagata University Hospital

MITSUO KAKU
Tohoku University Graduate School of
Medicine

TAKUO NAKAGAWA
Kozirakawa Shiseidou Hospital

IMAO SEKINE and JOJI SHIOTANI
The Cancer Institute Hospital of JFCR

AKIHIRO SUGITA, TATSUMI ITO and
JUN KATO
Yuri-Kumiai General Hospital

HAJIME HORIUCHI and YOKO TAZAWA
Kanto Medical Center, NTT EC

AKIRA SUWABE and KUMIKO YAMAHATA
Iwate Medical University Hospital

AKIKO YONEYAMA
Toranomon Hospital

CHIZUKO KAWAMURA
Aomori Prefectural Central Hospital

KAZUNARI KUMASAKA
Nihon University Itabashi Hospital
(Present: Ageo Chuo sogo Hospital)

HIROMI TASHIRO, HIROKO HORIUCHI and
YOSEI KATAYAMA
Hachinohe City Hospital

KAZUHIKO KOIKE
The University of Tokyo Hospital

SHIGEMI KONDOU and SHIGEKI MISAWA
Juntendo University School of Medicine

NOBUYUKI TANIGUCHI
Jichi Medical School

MISTURU MURATA and YOSHIO KOBAYASHI
Keio University School of Medicine

YUKIO OZAKI and TAKASHI UCHIDA
University of Yamanashi Hospital

HIDEYUKI OKAMOTO
Kawaguchi Municipal Medical Center

MASAMI MURAKAMI
Gunma University Hospital

KENICHIRO YAMAZAKI
Saitama Red Cross Hospital

KAZUHISA INUZUKA
Anjo Kosei Hospital

MOTOI OKADA
Koshigaya Municipal Hospital

HIDEO GONDA and IKUO YAMAGUCHI
Toyohashi Municipal Hospital

KOSUKE HARUKI
Dokkyo Medical University Koshigaya
Hospital

YOSHINORI FUJIMOTO, JUNJI IRIYAMA and
YUKO ASANO
Ogaki Municipal Hospital

HARUSHIGE KANNO and
MASANORI AIHARA
Takane Hospital

HITOSHI GENMA
Fukuroi Municipal Hospital
(Present: Genma Clinic)

SHIGEFUMI MAESAKI and GIICHI HASHIKITA
Saitama Medical University Hospital

MASATO MAEKAWA
Hamamatsu University School of Medicine

EIJI MIYAJIMA
Yokohama City University Medical Center

HITOSHI YOSHIMURA
Mie Prefectural Shima Hospital

MIDORI SUMITOMO
Yokohama City University Hospital

KANAME NAKATANI
Mie University Hospital

TAKEFUMI SAITO
Ibarakihigashi National Hospital

HISASHI BABA
Nagoya University Hospital

NOBUO YAMANE, CHIEKO KAWASHIMA and
TAKAHISA AKIYAMA
Ashikaga Red Cross Hospital

SATOSHI ICHIYAMA
Kyoto University Hospital

TAMIO IEIRI, YOSHITAKA YAMAMOTO and
YUKI OKAMOTO
Dokkyo Medical University Hospital

SHINICHI FUJITA
Kanazawa University Hospital

HIDETOSHI OKABE, KUNIHICO MORO and
MASAYO SHIGETA
Shiga University of Medical Science

HARUYOSHI YOSHIDA, MASANOBU YAMASHITA
and YUKIO HIDA
University of Fukui Hospital

TAKAYUKI TAKUBO and TADASHI KUSAKABE
Osaka Medical College Hospital

HIROYA MASAKI, HITOSHI HEIYOU and
HIDEO NAKAYA
Kansai Medical University Takii Hospital

KUNIMITSU KAWAHARA
Osaka Prefectural Medical Center for
Respiratory and Allergic Diseases

REIKO SANO
Nara Medical University Hospital

SYUJI MATSUO and HISASHI KONO
Tenri Hospital

YOSUKE YUZUKI, NORIO IKEDA and
MASAYA IDOMUKI
Japanese Red Cross Society Wakayama
Medical Center

MASAYUKI SOMA and GO YAMAMOTO
Nishi-kobe Medical Center

SYOHIRO KINOSHITA and SEIJI KAWANO
Kobe University Hospital

MIKIO OKA
Kawasaki Medical School

NOBUCHIKA KUSANO
Okayama University Hospital

MASAO KUWABARA
Hirosima Prefectural Hospital

TOSHIRO OKAZAKI, HIROMITSU FUJIWARA
and HIROMI OTA
Tottori University Hospital

ASTUSHI NAGAI
Shimane University Hospital

JUN FUJITA and KIYOSHI NEGAYAMA
Kagawa University Hospital

TETSURO SUGIURA and MIKIO KAMIOKA
Kochi Medical School

MITSUHARU MURASE
Ehime University Hospital

NOBUHISA YAMANE and ISAMU NAKASONE
Faculty of Medicine, University of the
Ryukyus

AKIHIKO OKAYAMA
University of Miyazaki Hospital

YOSUKE AOKI, KOJI KUSABA and
YUKARI NAKASHIMA
Saga Medical School Hospital

HIROAKI MIYANOHARA
Kagoshima University Medical and
Dental Hospital

KAZUFUMI HIRAMATSU and
TETSUNORI SAIKAWA
Oita University Hospital

KATSUNORI YANAGIHARA,
JUNICHI MATSUDA and SHIGERU KOHNO
Nagasaki University Hospital of Medicine
and Dentistry

DONGCHON KANG

Kyushu University Graduate School of
Medical Sciences

KOICHI MASHIBA

Kitakyushu Municipal Medical Center

JUNKO ONO

Fukuoka University Hospital

We have reported in this journal *in vitro* susceptibilities of clinical isolates to antibiotics every year since 1992. In this paper, we report the results of an analysis of *in vitro* susceptibilities of 12,919 clinical isolates from 72 centers in Japan to selected antibiotics in 2007 compared with the results from previous years.

The common respiratory pathogens, *Streptococcus pyogenes*, *Streptococcus pneumoniae*, *Moraxella catarrhalis* and *Haemophilus influenzae* maintained a high susceptibility to fluoroquinolones (FQs). The resistance of *S. pyogenes* to macrolides has been increasing every year and this was especially clear this year. Most strains of Enterobacteriaceae except for *Escherichia coli* showed a high susceptibility to FQs. Almost 30% of *E. coli* strains were resistant to FQs and the resistance increased further this year. FQs resistance of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA) was approximately 95% with the exception of 45% for sitafloxacin (STFX). FQs resistance of methicillin-susceptible *S. aureus* (MSSA) was low at about 10%. FQs resistance of methicillin-resistant coagulase negative Staphylococci (MRCNS) was higher than that of methicillin-susceptible coagulase negative Staphylococci (MSCNS), but it was lower than that of MRSA. However, FQs resistance of MSCNS was higher than that of MSSA. FQs resistance of *Enterococcus faecalis* was 22.5% to 29.6%, while that of *Enterococcus faecium* was more than 85% except for STFX (58.3%). In clinical isolates of *Pseudomonas aeruginosa* derived from urinary tract infections, FQs resistance was 21–27%, which was higher than that of *P. aeruginosa* from respiratory tract infections at 13–21%, which was the same trend as in past years. Multidrug resistant strains accounted for 5.6% in the urinary tract and 1.8% in the respiratory tract. *Acinetobacter* spp. showed high susceptibility to FQs. The carbapenem resistant strains, which present a problem at present, accounted for 2.7%. *Neisseria gonorrhoeae* showed high resistance of 86–88% to FQs.

The results of the present survey indicated that although methicillin-resistant Staphylococci, Enterococci, *E. coli*, *P. aeruginosa*, and *N. gonorrhoeae* showed resistance tendencies, and other species maintained high susceptibility rates more than 90% against FQs, which have been used clinically for over 15 years.